

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                           | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES                                                  | Schaderreger                                                                                                                              | Aufwandmenge                                                                                                        | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartefrist (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Fungizid                                                                              |              |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                 |                    |                   |                                     |
| Cuprozin progress (3405/0) [Bio]<br>[Kupferhydroxid]                                  | 113          | Chinakohl                                                          | Falscher Mehltau [Peronosporaceae]                                                                                                        | 2 l/ha                                                                                                              | 4               | 7 mind.            | 7                 | --- / ---                           |
|                                                                                       |              |                                                                    | Anwendungszeitpunkt: Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis                                                                        |                                                                                                                     |                 |                    |                   |                                     |
| Kumar (3399/0) [Bio]<br>[Kaliumhydrogencarbonat]                                      | 15           | Blattkohle                                                         | Echte Mehltapilze [Podosphaera sp.]                                                                                                       | 3 kg/ha                                                                                                             | 4               | 7 - 10             | 1                 | --- / ---                           |
|                                                                                       |              |                                                                    | Anwendungszeitpunkt: Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis,                                                                       |                                                                                                                     |                 |                    |                   |                                     |
| Kumulus WG (396/0) [Bio]<br>[Schwefel]                                                | 8            | Blattgemüse ausgenommen Kreuzblütler<br>(Brassicaceae), Blattkohle | Echte Mehltapilze [Erysiphaceae]                                                                                                          | 3,2 kg/ha                                                                                                           | 8               | mind. 7            | 1                 | 15.04.2026 / ---                    |
|                                                                                       |              |                                                                    | Anwendungszeitpunkt: Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warndienstinweis                                                                      |                                                                                                                     |                 |                    |                   |                                     |
|                                                                                       |              |                                                                    | Echte Mehltapilze [Erysiphaceae]                                                                                                          | 3,2 kg/ha                                                                                                           | 8               | mind. 7            | ---               | 15.04.2026 / ---                    |
|                                                                                       |              |                                                                    | Anwendungszeitpunkt: Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warndienstinweis                                                                      |                                                                                                                     |                 |                    |                   |                                     |
|                                                                                       |              |                                                                    | Echte Mehltapilze [Erysiphaceae]                                                                                                          | 3,2 kg/ha                                                                                                           | 4               | mind. 7            | 1                 | 15.04.2026 / ---                    |
|                                                                                       |              |                                                                    | Anwendungszeitpunkt: Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warndienstinweis                                                                      |                                                                                                                     |                 |                    |                   |                                     |
| Lalstop Contans WG (2752/0)<br>[Bio]<br>[Coniothyrium minitans, Stamm<br>CON/M/91-08] | 11           | Gemüsekulturen                                                     | Sclerotinia-Arten [Sclerotinia sp.]                                                                                                       | 4 kg/ha 4 kg/ha<br>bis 10 cm<br>Einarbeitungstief<br>e, 8 kg/ha max. 8<br>kg/ha bis 20 cm<br>Einarbeitungstief<br>e | 1               | ---                | ---               | 31.07.2033 / ---                    |
|                                                                                       |              |                                                                    | Anwendungszeitpunkt: Vor der Saat, Vor der Pflanzung, Bei Befallsgefahr, Mindestens 2 Monate vor einer möglichen<br>Sclerotinia-Infektion |                                                                                                                     |                 |                    |                   |                                     |
|                                                                                       |              |                                                                    | Sclerotinia-Arten [Sclerotinia sp.]                                                                                                       | 2 kg/ha max.                                                                                                        | 1               | ---                | ---               | 31.07.2033 / ---                    |
|                                                                                       |              |                                                                    | Anwendungszeitpunkt: Nach der Ernte                                                                                                       |                                                                                                                     |                 |                    |                   |                                     |
| Polyversum (3871/0) [Bio]<br>[Pythium oligandrum M1]                                  | 21           | Gemüsekulturen (Saatgutbehandlung)                                 | Auflaufkrankheiten [-]                                                                                                                    | 5 g/kg Saatgut                                                                                                      | 1               | ---                | ---               | --- / ---                           |
|                                                                                       |              |                                                                    | Anwendungszeitpunkt: Vor der Saat                                                                                                         |                                                                                                                     |                 |                    |                   |                                     |
|                                                                                       |              |                                                                    | Pilzliche Krankheitserreger [-]                                                                                                           | 0,2 kg/ha                                                                                                           | 1               | ---                | ---               | --- / ---                           |
|                                                                                       |              |                                                                    | Anwendungszeitpunkt: Vor dem Pflanzen                                                                                                     |                                                                                                                     |                 |                    |                   |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                                            | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES                  | Schaderreger                                                                                                                                          | Aufwandmenge                                                                             | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartezeit (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                        | 23           | Kohlgemüse (Brassicaceae)          | Falscher Mehltau [Hyaloperonospora brassicae], Fußfäule [Plenodomus lingam], Kohlschwärze [Alternaria brassicae]<br>Anwendungszeitpunkt:              | 0,2 kg/ha                                                                                | Nach Bedarf     | 5 - 7              | ---              | --- / ---                           |
| Romeo (3960/0) [Bio]<br>[Cerevisan]                                                                    | 10           | Kohlgemüse (Brassicaceae)          | Falscher Mehltau [Hyaloperonospora parasitica]<br>Anwendungszeitpunkt: Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstinweis                                  | 0,75 kg/ha                                                                               | 8               | 7 mind.            | 1                | 23.04.2031 / ---                    |
| Serenade ASO (3536/0) [Bio]<br>[Bacillus amyloliquefaciens,<br>Stamm QST 713 (vormals B.<br>subtilis)] | 34           | Blattkohle, Kopfkohle, Blumenkohle | Grauschimmel [Botrytis cinerea], Weißstängeligkeit [Sclerotinia sclerotiorum]<br>Anwendungszeitpunkt: Bei Infektionsgefahr bzw. nach Warndienstinweis | 8 l/ha                                                                                   | 6               | mind. 5            | ---              | --- / ---                           |
| Insektizid                                                                                             |              |                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                    |                  |                                     |
| Adalia (4127/0) [Bio]<br>[Zweipunktmarienkäfer (Adalia bipunctata [ADALBI])]                           | 16           | Blattkohle, Blumenkohle            | Mehlige Kohlblattlaus [Brevicoryne brassicae]<br>Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                                      | 30 Larven/m <sup>2</sup> 25-<br>30 Larven/m <sup>2</sup><br>oder 10 Käfer/m <sup>2</sup> | Nach Bedarf     | ---                | ---              | 31.08.2034 / ---                    |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                           | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES | Schaderreger                                           | Aufwandmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartefrist (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Amblymite (4301/0) [Bio]<br>[Raubmilbe (Amblyseius swirskii<br>[AMBSSW])]             | 1            | Gemüsekulturen    | Mottenschildläuse [Aleyrodidae],Thripse<br>[Thripidae] | 100<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>Pflanzenhöhe bis<br>50 cm: 25<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>(vorbeugend), 50<br>-100 Individuen<br>m <sup>2</sup> (bei Befall),<br>150<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>Pflanzenhöhe 50<br>-125 cm: 50<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>(vorbeugend),<br>100-150<br>Individuen m <sup>2</sup><br>(bei Befall), 200<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>Pflanzenhöhe ab<br>125 cm: 75<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>(vorbeugend),<br>150-200<br>Individuen m <sup>2</sup><br>(bei Befall) | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---               | 31.07.2036 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                       |              |                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                   |                                     |
| Aphelinus-System (4087/0) [Bio]<br>[Schlupfwespe (Aphelinus<br>abdominalis [APHEAB])] | 3            | Gemüsekulturen    | Blattläuse [Aphididae]                                 | 2 Puppen/m <sup>2</sup> 1-2<br>Puppen/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---               | 31.07.2034 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                       |              |                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                   |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                                        | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES                                                                                                                                                                                                              | Schaderreger                                          | Aufwandmenge                                                                                                                                                            | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartezeit (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Aphidius-System (3512/0) [Bio]<br>[Schlupfwespe (Aphidius colemani)]                               | 1            | Gemüsekulturen                                                                                                                                                                                                                 | Blattläuse [Aphididae]                                | 3 Individuen/m <sup>2</sup><br>Vorbeugend: 1 - 3 Bedarf<br>Individuen/m <sup>2</sup> , 5<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>Bei Befall: 2 - 5<br>Individuen/m <sup>2</sup> | Nach            | ---                | ---              | 31.03.2029 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                         |                 |                    |                  |                                     |
| Bactospeine DF (3968/0) [Bio]<br>[Bacillus thuringiensis subsp.<br>Kurstaki, Stamm ABTS 351]       | 8            | Chinakohl, Karfiol, Brokkoli, Kohlrabi, Grünkohl, Pak Choi, Kopfkohl, Kohlsprossen                                                                                                                                             | Freifressende Schmetterlingsraupen [1LEPIO]           | 1 kg/ha                                                                                                                                                                 | 8               | 7 mind.            | ---              | --- / ---                           |
| Anwendungszeitpunkt: Ab Schlüpfen der ersten Larven                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                         |                 |                    |                  |                                     |
| BotaniGard WP (3798/0) [Bio]<br>[Beauveria bassiana, Stamm GHA]                                    | 21           | Obstkulturen<br>(Jungpflanzenanzucht), Ackerbaukulturen<br>(Ausgenommen Kartoffel, Getriebe, Mais, Gräser; zur<br>Jungpflanzenanzucht), Gemüsekulturen<br>(Jungpflanzenanzucht), Zierpflanzenkulturen<br>(Jungpflanzenanzucht) | Weißer Fliegen [Bemisia tabaci, Bemisia argentifolii] | 0,375 kg/ha<br>Pflanzenhöhe bis<br>50 cm, 0,6 kg/ha<br>Pflanzenhöhe 50<br>bis 80 cm                                                                                     | 25              | mindest<br>ens 5   | ---              | 30.09.2026 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                         |                 |                    |                  |                                     |
|                                                                                                    | 22           | Ackerbaukulturen (Ausgenommen<br>Kartoffel, Getriebe, Mais, Gräser; zur<br>Saatguterzeugung), Gemüsekulturen<br>(Saatguterzeugung), Obstkulturen<br>(Saatguterzeugung), Zierpflanzenkulturen<br>(Saatguterzeugung)             | Weißer Fliegen [Bemisia tabaci, Bemisia argentifolii] | 0,375 kg/ha<br>Pflanzenhöhe bis<br>50 cm, 0,6 kg/ha<br>Pflanzenhöhe 50<br>bis 80 cm                                                                                     | 25              | mindest<br>ens 5   | ---              | 30.09.2026 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                         |                 |                    |                  |                                     |
| Chryson (2487/0) [Bio]<br>[Florfliege (Chrysoperla carnea<br>[CHROCR])]                            | 7            | Gewürzkräuter, Kräuter, Gemüsekulturen, Arzneipflanzen (Heilkräuter)                                                                                                                                                           | Blattläuse [Aphididae], Thripse [-]                   | 10 Larven/m <sup>2</sup> 5 -<br>10 Eier oder<br>Larven/m <sup>2</sup>                                                                                                   | Nach<br>Bedarf  | 14<br>mind.        | ---              | 30.04.2033 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Ab Befall                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                         |                 |                    |                  |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                 | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES | Schaderreger                                                        | Aufwandmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartezeit (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Chrysoperla (4282/0) [Bio]<br>[Florfliege (Chrysoperla carnea<br>[CHROCR])] | 7            | Gemüseulturen     | Blattläuse [Aphis fabae, Myzus<br>persicae], Thripse [Thysanoptera] | 20 Larven/m <sup>2</sup><br>Pflanzengröße<br>bis 50 cm: 10-20<br>Larven/m <sup>2</sup> , 50<br>Larven/m <sup>2</sup> 10-50<br>Larven/m <sup>2</sup> , 50<br>Larven/m <sup>2</sup><br>Pflanzengröße 50<br>- 125 cm: 20-30<br>Larven/m <sup>2</sup> , 50<br>Larven/m <sup>2</sup><br>Pflanzengröße<br>über 125 cm: 30-<br>50 Larven/m <sup>2</sup> | Nach<br>Bedarf  | 14<br>Mind.        | ---              | 31.08.2036 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                             |              |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                    |                  |                                     |
|                                                                             | 12           | Gemüseulturen     | Mottenschildläuse [Aleyrodidae]                                     | 20 Larven/m <sup>2</sup><br>Pflanzengröße<br>bis 50 cm: 10-20<br>Larven/m <sup>2</sup> , 50<br>Larven/m <sup>2</sup> 10-50<br>Larven/m <sup>2</sup> , 50<br>Larven/m <sup>2</sup><br>Pflanzengröße 50<br>- 125 cm: 20-30<br>Larven/m <sup>2</sup> , 50<br>Larven/m <sup>2</sup><br>Pflanzengröße<br>über 125 cm: 30-<br>50 Larven/m <sup>2</sup> | Nach<br>Bedarf  | 14<br>Mind.        | ---              | 31.08.2036 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                             |              |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                    |                  |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                                                         | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES | Schaderreger                                                                                                                                                                                         | Aufwandmenge                                                                                                                               | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartezeit (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Cryptolaemus(-L)-System<br>(4126/0) [Bio]<br>[Australischer Marienkäfer<br>(Cryptolaemus montrouzieri<br>[CRYEMO])] | 6            | Gemüsekulturen    | Woll- oder Schmierläuse [Pseudococcidae]                                                                                                                                                             | 3 Individuen/m <sup>2</sup><br>2-3<br>Individuen/m <sup>2</sup>                                                                            | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---              | 31.08.2034 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                                                     |              |                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                 |                    |                  |                                     |
| Degenerans-System (2944/0)<br>[Bio]<br>[Raubmilbe (Iphiseius<br>degenerans [AMBSDG])]                               | 1            | Gemüsekulturen    | Thripse [Thrips]                                                                                                                                                                                     | 2<br>Individuen/10m <sup>2</sup><br>2<br>Individuen/10m <sup>2</sup>                                                                       | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---              | 31.08.2034 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend                                                                                     |              |                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                 |                    |                  |                                     |
| Encarsia-System (3514/0) [Bio]<br>[Erzwespe (Encarsia formosa<br>[ENCAFO])]                                         | 1            | Gemüsekulturen    | Weißer Fliege [Trialeurodes<br>vaporariorum], Weiße Fliegen [BEMITA,<br>Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]                                                                                   | 2 Puppen/m <sup>2</sup><br>Vorbeugend: 1-2<br>Puppen/m <sup>2</sup> , 5<br>Puppen/m <sup>2</sup> Bei<br>Befall: 5<br>Puppen/m <sup>2</sup> | Nach<br>Bedarf  | Mind. 7            | ---              | 31.03.2029 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                                                     |              |                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                 |                    |                  |                                     |
| Engerling-Stopp (4249/0) [Bio]<br>[Entomopathogene Nematoden<br>(Heterorhabditis bacteriophora<br>[HETOBA])]        | 12           | Gemüsekulturen    | Gartenlaubkäfer [Phyllopertha<br>horticola], Gefurchter Dickmaulrüssler<br>[Otiorhynchus sulcatus], Großer Graslaubkäfer<br>[Hoplia philanthus], Weiden-Dickmaulrüssler<br>[Otiorhynchus salicicola] | 0,5<br>Nematoden/m <sup>2</sup><br>0,5 Mio.<br>Nematoden/m <sup>2</sup>                                                                    | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---              | 31.12.2035 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                                                     |              |                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                 |                    |                  |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                             | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES                    | Schaderreger                | Aufwandmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartefrist (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Entonem (4515/0) [Bio]<br>[Entomopathogene Nematoden<br>(Steinernema feltiae [NEAPGL])] | 11           | Zierpflanzenkulturen, Gemüsekulturen | Minierfliegen [Agromyzidae] | 1,13<br>Nematoden/ha<br>Pflanzenhöhe bis<br>50 cm: 1,13 Mrd.<br>Nematoden/ha,<br>2,25<br>Nematoden/ha<br>Max. 2,25 Mrd.<br>Nematoden/ha,<br>2,25<br>Nematoden/ha<br>Pflanzenhöhe<br>über 125 cm:<br>2,25 Mrd.<br>Nematoden/ha,<br>50<br>Nematoden/ha<br>Pflanzenhöhe 50<br>- 125 cm: 1,69<br>Mrd.<br>Nematoden/ha | 3               | 7 Mind.            | ---               | 30.06.2039 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                         |              |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                    |                   |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                             | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES                    | Schaderreger                              | Aufwandmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartezeit (Tage) | Zulassungsende /<br>Auflösungsfrist |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                                         | 16           | Zierpflanzenkulturen, Gemüsekulturen | Eulenraupen [Noctuidae]                   | 0,938<br>Nematoden/ha<br>Pflanzenhöhe bis<br>50 cm: 0,938<br>Mrd.<br>Nematoden/ha,<br>1,875<br>Nematoden/ha<br>Max. 1,875 Mrd.<br>Nematoden /ha,<br>1,875<br>Nematoden/ha<br>Pflanzenhöhe<br>über 125 cm:<br>1,875 Mrd.<br>Nematoden/ha,<br>50<br>Nematoden/ha<br>Pflanzenhöhe 50<br>- 125 cm: 1,406<br>Mrd.<br>Nematoden/ha | 3               | 5 Mind.            | ---              | 30.06.2039 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                         |              |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                    |                  |                                     |
| Helicovex (4228/0) [Bio]<br>[Helicoverpa armigera<br>nucleopolyhedrovirus<br>(HearNPV)] | 36           | Kohlgemüse (Brassicaceae)            | Baumwollkapselwurm [Helicoverpa armigera] | 0,2 l/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9               | mind. 8            | 1                | 31.10.2026 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Eiablage und erstem Raupenschlupf                              |              |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                    |                  |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                  | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES | Schaderreger                                                 | Aufwandmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartezeit (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Hypoaspis (4305/0) [Bio]<br>[Raubmilbe (Hypoaspis miles<br>[STTLMI])]        | 3            | Gemüsekulturen    | Thripse [Thrips], Wurzelgallennematoden<br>[Meloidogyne sp.] | 500 Milben/m <sup>2</sup><br>Vorbeugend: 50-<br>500 Milben/m <sup>2</sup> ,<br>1000 Milben/m <sup>2</sup><br>Bei Befall: 500-<br>1000 Milben/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---              | 31.07.2036 / ---                    |
|                                                                              |              |                   | Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                    |                  |                                     |
|                                                                              | 5            | Gemüsekulturen    | Trauermückenlarven [Bradysia sp.]                            | 500 Milben/m <sup>2</sup><br>Vorbeugend: 50-<br>500 Milben/m <sup>2</sup> ,<br>1000 Milben/m <sup>2</sup><br>Bei Befall: 500-<br>1000 Milben/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---              | 31.07.2036 / ---                    |
|                                                                              |              |                   | Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                    |                  |                                     |
| Hypoaspis-System (3567/0) [Bio]<br>[Raubmilbe (Hypoaspis miles<br>[STTLMI])] | 3            | Gemüsekulturen    | Thripse [Thysanoptera], Trauermücken<br>[Bradysia sp.]       | 500<br>Individuen/m <sup>2</sup> 50<br>- 500<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>geringer<br>Befallsdruck<br>und/oder<br>längerer<br>Anwendungszeit<br>raum, 1000<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>500 - 1000<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>hoher<br>Befallsdruck<br>und/oder kurzer<br>Anwendungszeit<br>raum | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---              | 30.09.2029 / ---                    |
|                                                                              |              |                   | Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                    |                  |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                                        | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES                                                 | Schaderreger                                                                                                                                                                                             | Aufwandmenge                                                                      | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartezeit (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Larven-Stopp (4298/0) [Bio]<br>[Entomopathogene Nematoden<br>(Steinernema feltiae [NEAPGL])]       | 4            | Gemüsekulturen                                                    | Kalifornischer Blütenthrips [Frankliniella<br>occidentalis],Trauermücken [Bradysia sp.]                                                                                                                  | 0,5<br>Nematoden/m²<br>0,5 Mio.<br>Nematoden/m²                                   | Nach<br>Bedarf  | -                  | -                | 31.07.2036 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                                    |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |                    |                  |                                     |
| Lepinox Plus (3657/0) [Bio]<br>[Bacillus thuringiensis subsp.<br>Kurstaki, Stamm EG 2348]          | 9            | Blattkohle,Kopfkohle,Blumenkohle                                  | Afrikanischer Baumwollwurm [Spodoptera<br>littoralis],Baumwollkapselwurm [Helicoverpa<br>armigera],Eulenraupen<br>[Noctuidae],Kohlschabe [Plutella<br>xylostella],Zuckerrübeneule [Spodoptera<br>exigua] | 1 kg/ha                                                                           | 3               | 7                  | ---              | --- / ---                           |
| Anwendungszeitpunkt: Ab Schlüpfen der ersten Larven                                                |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |                    |                  |                                     |
| NeemAzal-T/S (2699/0) [Bio]<br>[Azadirachtin(MRL: 1)]                                              | 210          | Chinakohl,Grünkohl                                                | Beißende Insekten [-],Saugende Insekten [-]                                                                                                                                                              | 2,5 l/ha                                                                          | 3               | 7 mind.            | 7                | 31.08.2025 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |                    |                  |                                     |
|                                                                                                    | 211          | Chinakohl (Jungpflanzenanzucht),Grünkohl<br>(Jungpflanzenanzucht) | Beißende Insekten [-],Saugende Insekten [-]                                                                                                                                                              | 2,5 l/ha                                                                          | 3               | 7 mind.            | 28               | 31.08.2025 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |                    |                  |                                     |
|                                                                                                    | 263          | Gemüsekulturen (Jungpflanzen)                                     | Blattläuse [Aphididae]                                                                                                                                                                                   | 2,5 l/ha                                                                          | 4               | 7 mind.            | ---              | 28.08.2025 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Schadorganismen              |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |                    |                  |                                     |
| NemaFence Felti (3564/0) [Bio]<br>[Entomopathogene Nematoden<br>(Steinernema feltiae [NEAPGL])]    | 20           | Gemüsekulturen                                                    | Trauermücken [Bradysia sp.]                                                                                                                                                                              | 500000<br>Individuen/m²<br>Vorbeugend;<br>1000000<br>Individuen/m²<br>Bei Befall: | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---              | 30.09.2029 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                                    |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |                    |                  |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                                       | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES                                                  | Schaderreger                                                                          | Aufwandmenge                                                                                             | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartezeit (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                   | 21           | Gemüsekulturen                                                     | Minierfliegen [Liriomyza], Thripse [Thrips]                                           | 125000<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>Vorbeugend;<br>250000<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>Bei Befall: | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---              | 30.09.2029 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                                   |              |                                                                    |                                                                                       |                                                                                                          |                 |                    |                  |                                     |
| Nemahelp (2720/0) [Bio]<br>[Entomopathogene Nematoden<br>(Steinernema feltiae [NEAPGL])]          | 6            | Gemüsekulturen, Kräuter, Gewürze und<br>Heilkräuter/Arzneipflanzen | Kalifornischer Blütenthrips [Frankliniella<br>occidentalis], Trauermücken [Sciaridae] | 5 Nematoden/ha<br>5 Mrd.<br>Nematoden/ha                                                                 | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---              | 31.01.2040 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                                   |              |                                                                    |                                                                                       |                                                                                                          |                 |                    |                  |                                     |
| Nemastar (2969/0) [Bio]<br>[Entomopathogene Nematoden<br>(Steinernema carpocapsae<br>[NEAPCA])]   | 10           | Gemüsekulturen                                                     | Maulwurfsgrillen [Gryllotalpa gryllotalpa]                                            | 500000<br>Nematoden/m <sup>2</sup>                                                                       | 4               | 14                 | ---              | 30.04.2033 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Anfang Mai bis Ende Juni                                                     |              |                                                                    |                                                                                       |                                                                                                          |                 |                    |                  |                                     |
|                                                                                                   | 12           | Gemüsekulturen                                                     | Erdräupen [Agrotis spp.]                                                              | 500000<br>Nematoden/m <sup>2</sup>                                                                       | 4               | 14                 | ---              | 30.04.2033 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Anfang Juli bis Ende September                                               |              |                                                                    |                                                                                       |                                                                                                          |                 |                    |                  |                                     |
| Nema-Stopp (4512/0) [Bio]<br>[Entomopathogene Nematoden<br>(Steinernema carpocapsae<br>[NEAPCA])] | 3            | Gemüsekulturen                                                     | Maulwurfsgrillen [Gryllotalpa gryllotalpa]                                            | 5 Nematoden/ha<br>5 Mrd.<br>Nematoden/ha                                                                 | Nach<br>Bedarf  | Nach<br>Bedarf     | ---              | 31.05.2039 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                                   |              |                                                                    |                                                                                       |                                                                                                          |                 |                    |                  |                                     |
|                                                                                                   | 8            | Gemüsekulturen                                                     | Eulenraupen [Noctuidae]                                                               | 5 Nematoden/ha<br>5 Mrd.<br>Nematoden/ha                                                                 | Nach<br>Bedarf  | Nach<br>Bedarf     | ---              | 31.05.2039 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                                   |              |                                                                    |                                                                                       |                                                                                                          |                 |                    |                  |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                                    | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES         | Schaderreger                                 | Aufwandmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartefrist (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Neomite (4304/0) [Bio]<br>[Raubmilbe (Neoseiulus<br>californicus [AMBSCA])]                    | 2            | Gemüsekulturen            | Weichhautmilben [Tarsonemidae]               | 100<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>Pflanzenhöhe bis<br>50 cm: 25<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>(vorbeugend), 50<br>-100 Individuen<br>m <sup>2</sup> (bei Befall),<br>150<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>Pflanzenhöhe 50<br>-125 cm: 50<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>(vorbeugend),<br>100-150<br>Individuen m <sup>2</sup><br>(bei Befall), 200<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>Pflanzenhöhe ab<br>125 cm: 75<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>(vorbeugend),<br>150-200<br>Individuen m <sup>2</sup><br>(bei Befall) | Nach<br>Bedarf  | 14<br>Mind.        | ---               | 31.07.2036 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                                |              |                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                   |                                     |
| Neudosan Neu Blattlausfrei<br>(2622/0) [Bio]<br>[Fettsäuren, Kaliumsalze (Kali-<br>Seife)]     | 17           | Kohlgemüse (Brassicaceae) | Blattläuse [Aphididae],Saugende Insekten [-] | 18 l/ha<br>Pflanzenhöhe bis<br>50 cm, 27 l/ha<br>Pflanzenhöhe 50<br>bis 125 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5               | 7 mind.            | ---               | 15.12.2025 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall bzw. ab Erreichen von Schadschwellen oder ab Warndiensthinweis |              |                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                   |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                              | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES             | Schaderreger                                                                                                                  | Aufwandmenge                                                                   | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartefrist (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                                          | 17           | Kohlgemüse                    | Blattläuse [Aphididae],Saugende Insekten [-]                                                                                  | 18 l/ha<br>Pflanzenhöhe bis<br>50 cm, 27 l/ha<br>Pflanzenhöhe 50<br>bis 125 cm | 5               | mindest<br>ens 7   | ---               | 15.12.2025 / ---                    |
|                                                                          |              |                               | Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen                            |                                                                                |                 |                    |                   |                                     |
| Nützlings-Nematoden (4038/0)<br>[Bio]                                    | 3            | Gemüsekulturen                | Maulwurfsgrillen [Gryllotalpa gryllotalpa]                                                                                    | 500000<br>Individuen/m <sup>2</sup>                                            | 1               | ---                | ---               | 31.01.2034 / ---                    |
| [Entomopathogene Nematoden<br>(Steinernema carpocapsae<br>[NEAPCA])]     | 5            | Gemüsekulturen                | Erdräupen [Agrotis sp.]                                                                                                       | 500000<br>Individuen/m <sup>2</sup>                                            | 1               | ---                | ---               | 31.01.2034 / ---                    |
|                                                                          |              |                               | Anwendungszeitpunkt: Während der Vegetationsperiode                                                                           |                                                                                |                 |                    |                   |                                     |
| Raptol HP (4477/0) [Bio]<br>[Pyrethrine(MRL: 1)]                         | 14           | Gemüsekulturen (Jungpflanzen) | Blattläuse [Aphididae]                                                                                                        | 0,6 l/ha                                                                       | 2               | 5 mind.            | 3                 | 15.06.2027 / ---                    |
|                                                                          |              |                               | Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen                            |                                                                                |                 |                    |                   |                                     |
|                                                                          | 15           | Gemüsekulturen (Jungpflanzen) | Schmetterlingsraupen [Lepidoptera]                                                                                            | 0,6 l/ha                                                                       | 2               | 5 mind.            | 3                 | 15.06.2027 / ---                    |
|                                                                          |              |                               | Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen                            |                                                                                |                 |                    |                   |                                     |
| Schädlingsfrei Obst & Gemüse<br>Konzentrat (2568/0) [Bio]<br>[Rapsöl]    | 3            | Kohlgemüse (Brassicaceae)     | Blattläuse [Aphididae],Weiße Fliege<br>[Mottenschildlaus]                                                                     | 12 l/ha                                                                        | 3               | 7 - 10             | ---               | 15.12.2025 / ---                    |
|                                                                          |              |                               | Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn                                                                                        |                                                                                |                 |                    |                   |                                     |
|                                                                          | 7            | Kohlgemüse (Brassicaceae)     | Spinnmilben [-],Weiße Fliege<br>[Mottenschildlaus]                                                                            | 12 l/ha                                                                        | 6               | 7 - 10             | ---               | 15.12.2025 / ---                    |
|                                                                          |              |                               | Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn                                                                                        |                                                                                |                 |                    |                   |                                     |
| SpinTor (3296/0) [Bio]<br>[Spinosad(MRL: 2)]                             | 77           | Blattkohle                    | Freifressende Schmetterlingsraupen<br>[1LEPIO],Minierfliegen [Agromyzidae]                                                    | 0,2 l/ha                                                                       | 2               | mind.<br>10 - 14   | 3                 | 15.03.2026 / ---                    |
|                                                                          |              |                               | Anwendungszeitpunkt: Ab Schlüpfen der ersten Larven,Bei Befall bzw. ab Erreichen von Schadschwellen oder ab Warndiensthinweis |                                                                                |                 |                    |                   |                                     |
| Spruzit Schädlingsfrei (3141/0)<br>[Bio]<br>[Pyrethrine(MRL: 1), Rapsöl] | 9            | Gemüsekulturen (Jungpflanzen) | Blattläuse [Aphididae],Saugende Schädlinge<br>[],Weiße Fliegen [Aleyrodidae],Zikaden<br>[Cicadellidae]                        | 6 l/ha                                                                         | 2               | 5 Mind.            | ---               | 15.12.2025 / ---                    |
|                                                                          |              |                               | Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen                            |                                                                                |                 |                    |                   |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                                        | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES             | Schaderreger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwandmenge                                                                                                                                                                                                                                                                    | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartefrist (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                    | 10           | Gemüsekulturen (Jungpflanzen) | Beißende Insekten [-], Käfer<br>[Coleoptera], Schmetterlingsraupen<br>[Lepidoptera]                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 l/ha                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2               | 5 Mind.            | ---               | 15.12.2025 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                    |                   |                                     |
| Swirskii-Breeding System<br>(3076/0) [Bio]<br>[Raubmilbe (Amblyseius swirskii<br>[AMBSSW])]        | 3            | Gemüsekulturen                | Thripse [Thrips], Weiße Fliege [Trialeurodes<br>vaporariorum]                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2500<br>Säckchen/ha<br>Pflanzenhöhe bis<br>50 cm: 2500<br>Säckchen/ha,<br>3750<br>Säckchen/ha<br>Pflanzenhöhe 50<br>- 125 cm: 3750<br>Säckchen/ha,<br>5000<br>Säckchen/ha<br>Max. 5000<br>Säckchen/ha,<br>5000<br>Säckchen/ha<br>Pflanzenhöhe ab<br>125 cm: 5000<br>Säckchen/ha | Nach<br>Bedarf  | 28<br>Mind.        | ---               | 31.10.2036 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                                    |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                    |                   |                                     |
| Swirski-Mite (2938/0) [Bio]<br>[Raubmilbe (Amblyseius swirskii<br>[AMBSSW])]                       | 1            | Gemüsekulturen                | Kalifornischer Blütenthrips [Frankliniella<br>occidentalis], Thripse [Frankliniella<br>occidentalis], Weiße Fliege [Trialeurodes<br>vaporariorum], Weiße Fliegen [BEMITA,<br>Trialeurodes vaporariorum, Bemisia<br>tabaci], Weiße Fliegen (Mottenschildlaus)<br>[Trialeurodes vaporariorum, Bemisia<br>tabaci], Zwiebelthrips [Thrips tabaci] | 100<br>Individuen/m²<br>Vorbeugend: 20<br>Individuen/m²,<br>bei Befall: 50-100<br>Individuen/m²                                                                                                                                                                                 | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---               | 31.10.2034 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                                    |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                    |                   |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                                  | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES         | Schaderreger                                                                                                                      | Aufwandmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartefrist (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                                                              | 13           | Gemüsekulturen            | Kalifornischer Blütenthrips [Frankliniella occidentalis], Weiße Fliege [Trialeurodes vaporariorum], Zwiebelthrips [Thrips tabaci] | 100 Individuen/m <sup>2</sup><br>Vorbeugend: 20 Individuen/m <sup>2</sup> ,<br>bei Befall: 50-100 Individuen/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                            | Nach Bedarf     | ---                | ---               | 31.10.2034 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                              |              |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |                   |                                     |
| XenTari (3431/0) [Bio]                                                                       | 1            | Kohlgemüse (Brassicaceae) | Freifressende Schmetterlingsraupen [1LEPIO]                                                                                       | 0,6 kg/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 5 - 7              | 9                 | --- / ---                           |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall, unter Beachtung der Schadensschwelle, Larvenstadium L1 - L3 |              |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |                   |                                     |
| Aizawai, Stamm ABTS-1857 und GC-91]                                                          | 2            | Kohlgemüse (Brassicaceae) | Eulenraupen [Noctuidae]                                                                                                           | 1 kg/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6               | 5 - 7              | 9                 | --- / ---                           |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall, unter Beachtung der Schadensschwelle, Larvenstadium L1 - L3 |              |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |                   |                                     |
| Akarizid                                                                                     |              |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |                   |                                     |
| Californicus-System (3068/0) [Bio]                                                           | 1            | Gemüsekulturen            | Gemeine Spinnmilbe [Tetranychus urticae], Spinnmilben [-]                                                                         | 2 Individuen/ha<br>Max. 1 000 000 - 2 000 000 Individuen/ha<br>(bei Befall), 130 Individuen/ha<br>Pflanzenhöhe bis 50 cm: 50 000 - 130 000 Individuen/ha<br>(vorbeugend), 190 Individuen/ha<br>Pflanzenhöhe 50 - 125 cm: 80 000 - 190 000 Individuen/ha<br>(vorbeugend), 250 000/ha<br>Pflanzenhöhe ab | Nach Bedarf     | 21<br>Mind.        | ---               | 31.10.2036 / ---                    |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]     | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES | Schaderreger | Aufwandmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartefrist (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                 |              |                   |              | 125 cm: 100 000<br>- 250 000/ha<br>(vorbeugend),<br>250<br>Individuen/ha<br>Max. 100 000 -<br>250 000<br>Individuen/ha<br>(vorbeugend),<br>500<br>Individuen/ha<br>Pflanzenhöhe 50<br>- 125 cm: 1 000<br>000 - 1 500 000<br>Individuen/ha<br>(bei Befall), 500<br>Individuen/ha<br>Pflanzenhöhe ab<br>125 cm: 1 500<br>000 - 2 000 000<br>Individuen/ha<br>(bei Befall), 500<br>Individuen/ha<br>Pflanzenhöhe bis<br>50 cm: 500 000 -<br>1 000 000<br>Individuen/ha<br>(bei Befall) |                 |                    |                   |                                     |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                    |                   |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                             | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES                                                     | Schaderreger                             | Aufwandmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartezeit (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                         | 7            | Gemüsekulturen                                                        | Gemeine Spinnmilbe [Tetranychus urticae] | 13 Säckchen/ha<br>Pflanzenhöhe bis<br>50 cm: 5 000 - 13<br>000<br>Säckchen/ha, 25<br>Säckchen/ha<br>Max. 10 000 - 25<br>000<br>Säckchen/ha, 25<br>Säckchen/ha<br>Pflanzenhöhe ab<br>125 cm: 10 000 -<br>25 000<br>Säckchen/ha,<br>500 Säckchen/ha<br>Pflanzenhöhe 50<br>- 125 cm: 7 500 -<br>20 000<br>Säckchen/ha | Nach<br>Bedarf  | 28<br>Mind.        | ---              | 31.10.2036 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                         |              |                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                    |                  |                                     |
| Chryson (2487/0) [Bio]<br>[Florfliege (Chrysoperla carnea<br>[CHROCR])] | 8            | Gewürzkräuter,Kräuter,Gemüsekulturen,Ar<br>zneipflanzen (Heilkräuter) | Spinnmilben [Tetranychidae]              | 10 Larven/m² 5 -<br>10 Eier oder<br>Larven/m²                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nach<br>Bedarf  | 14<br>mind.        | ---              | 30.04.2033 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Ab Befall                                          |              |                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                    |                  |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                                | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES | Schaderreger                                                                                                                         | Aufwandmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartefrist (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Chrysoperla (4282/0) [Bio]<br>[Florfliege (Chrysoperla carnea<br>[CHROCR])]                | 8            | Gemüsekulturen    | Spinnmilben [Tetranychus sp.]                                                                                                        | 20 Larven/m <sup>2</sup><br>Pflanzengröße<br>bis 50 cm: 10-20<br>Larven/m <sup>2</sup> , 50<br>Larven/m <sup>2</sup> 10-50<br>Larven/m <sup>2</sup> , 50<br>Larven/m <sup>2</sup><br>Pflanzengröße 50<br>- 125 cm: 20-30<br>Larven/m <sup>2</sup> , 50<br>Larven/m <sup>2</sup><br>Pflanzengröße<br>über 125 cm: 30-<br>50 Larven/m <sup>2</sup> | Nach<br>Bedarf  | 14<br>Mind.        | ---               | 31.08.2036 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                            |              |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                    |                   |                                     |
| Feltiella-System (3619/0) [Bio]<br>[Gallmücke (Feltiella acarisuga<br>[THRDPE])]           | 1            | Gemüsekulturen    | Gemeine Spinnmilbe [Tetranychus<br>urticae],Karminspinnmilbe [Tetranychus<br>cinnabarinus],Spinnmilben [Tetranychus<br>cinnabarinus] | 3 Töpfe/ha 2-3<br>Töpfe/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---               | 31.05.2031 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend                                                            |              |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                    |                   |                                     |
|                                                                                            | 3            | Gemüsekulturen    | Gemeine Spinnmilbe [Tetranychus<br>urticae],Karminspinnmilbe [Tetranychus<br>cinnabarinus],Spinnmilben [Tetranychus<br>cinnabarinus] | 10 Töpfe/ha 10<br>Töpfe/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6               | Mind. 7            | ---               | 31.05.2031 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                            |              |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                    |                   |                                     |
| Phytoseiulus-System (3515/0)<br>[Bio]<br>[Raubmilbe (Phytoseiulus<br>persimilis [PHSLRI])] | 1            | Gemüsekulturen    | Gemeine Spinnmilbe [Tetranychus<br>urticae],Spinnmilben [Tetranychidae]                                                              | 6 Individuen/m <sup>2</sup><br>Vorbeugend: 6<br>Individuen/m <sup>2</sup> ,<br>40 Individuen/m <sup>2</sup><br>Bei Befall: 20-40<br>Individuen/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                    | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---               | 31.03.2029 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                            |              |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                    |                   |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                                  | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES | Schaderreger                | Aufwandmenge                                                                                                                                                                                                                                                                    | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartefrist (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Swirskii-Breeding System<br>(3076/0) [Bio]<br>[Raubmilbe (Amblyseius swirskii<br>[AMBSSW]))] | 9            | Gemüsekulturen    | Spinnmilben [Tetranychidae] | 2500<br>Säckchen/ha<br>Pflanzenhöhe bis<br>50 cm: 2500<br>Säckchen/ha,<br>3750<br>Säckchen/ha<br>Pflanzenhöhe 50<br>- 125 cm: 3750<br>Säckchen/ha,<br>5000<br>Säckchen/ha<br>Max. 5000<br>Säckchen/ha,<br>5000<br>Säckchen/ha<br>Pflanzenhöhe ab<br>125 cm: 5000<br>Säckchen/ha | Nach<br>Bedarf  | 28<br>Mind.        | ---               | 31.10.2036 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                              |              |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                    |                   |                                     |
| Akarizid;Insektizid                                                                          |              |                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                    |                   |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES | Schaderreger                                                                                               | Aufwandmenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartefrist (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Amblymite (4301/0) [Bio]<br>[Raubmilbe (Amblyseius swirskii<br>[AMBSSW])]  | 2            | Gemüsekulturen    | Gallmilben [Eriophyidae], Spinnmilben<br>[Tetranychidae], Weichhautmilben<br>[Tarsonemidae]                | 100<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>Pflanzenhöhe bis<br>50 cm: 25<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>(vorbeugend), 50<br>-100 Individuen<br>m <sup>2</sup> (bei Befall),<br>150<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>Pflanzenhöhe 50<br>-125 cm: 50<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>(vorbeugend),<br>100-150<br>Individuen m <sup>2</sup><br>(bei Befall), 200<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>Pflanzenhöhe ab<br>125 cm: 75<br>Individuen/m <sup>2</sup><br>(vorbeugend),<br>150-200<br>Individuen m <sup>2</sup><br>(bei Befall) | Nach<br>Bedarf  | ---                | ---               | 31.07.2036 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                            |              |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                   |                                     |
| Limonicus-(Breeding-)System<br>(4209/0) [Bio]<br>[Raubmilbe (Amblydromalus | 5            | Gemüsekulturen    | Gemeine Spinnmilbe [Tetranychus<br>urticae], Thripse [Thrips], Weiße Fliege<br>[Trialeurodes vaporariorum] | 150<br>Individuen/m <sup>2</sup> 5 -<br>150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nach<br>Bedarf  | 7                  | ---               | 31.12.2034 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                            |              |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                   |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                          | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES                                                                   | Schaderreger                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwandmenge                                                                                                          | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage) | Wartefrist (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| limonicus [AMBSLI]]                                                                  | 6            | Gemüsekulturen                                                                      | Gemeine Spinnmilbe [Tetranychus urticae], Thripse [Thrips], Weiße Fliege [Trialeurodes vaporariorum]                                                                                                                                                                                      | 1 Säckchen/m <sup>2</sup> 1 Säckchen/m <sup>2</sup>                                                                   | Nach Bedarf     | 28                 | ---               | 31.12.2034 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                      |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                    |                   |                                     |
| Swirskii-System (3004/0) [Bio]<br>[Raubmilbe (Amblyseius swirskii [AMBSSW]]]         | 3            | Gemüsekulturen                                                                      | Gemeine Spinnmilbe [Tetranychus urticae], Thripse [Thrips], Weiße Fliege [Trialeurodes vaporariorum], Weiße Fliegen [BEMITA, Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]                                                                                                                   | 20 Individuen/m <sup>2</sup> Vorbeugend:, 100 Individuen/m <sup>2</sup> Bei Befall:                                   | Nach Bedarf     | ---                | ---               | 30.09.2035 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                      |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                    |                   |                                     |
| Swirski-Mite (2938/0) [Bio]<br>[Raubmilbe (Amblyseius swirskii [AMBSSW]]]            | 2            | Gemüsekulturen                                                                      | Gallmilben [Eriophyidae], Gemeine Spinnmilbe [Tetranychus urticae], Thripse [Frankliniella occidentalis], Weichhautmilben [Tarsonemidae], Weiße Fliegen [BEMITA, Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci], Weiße Fliegen (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci] | 100 Individuen/m <sup>2</sup> Vorbeugend: 20 Individuen/m <sup>2</sup> , bei Befall: 50-100 Individuen/m <sup>2</sup> | Nach Bedarf     | ---                | ---               | 31.10.2034 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                      |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                    |                   |                                     |
|                                                                                      | 14           | Gemüsekulturen                                                                      | Gallmilben [Eriophyidae], Gemeine Spinnmilbe [Tetranychus urticae], Weichhautmilben [Tarsonemidae]                                                                                                                                                                                        | 100 Individuen/m <sup>2</sup> Vorbeugend: 20 Individuen/m <sup>2</sup> , bei Befall: 50-100 Individuen/m <sup>2</sup> | Nach Bedarf     | ---                | ---               | 31.10.2034 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Vorbeugend oder bei Befall                                      |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                    |                   |                                     |
| Keine Zuordnung                                                                      |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                    |                   |                                     |
| Entonem (4515/0) [Bio]<br>[Entomopathogene Nematoden (Steinernema feltiae [NEAPGL]]] | 1            | Zierpflanzenkulturen, Gemüsekulturen, Erdbeeren, Beerenobst (Ausgenommen Erdbeeren) | Gefurchter Dickmaulrüssler [Otiorynchus sulcatus], Rüsselkäfer [Curculionidae]                                                                                                                                                                                                            | 5 Nematoden/ha 3 Max. 5 Mrd. Nematoden /ha                                                                            |                 | 7 Mind.            | ---               | 30.06.2039 / ---                    |
| Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                      |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |                    |                   |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

| Pflanzenschutzmittel (RegNr)<br>[Wirkstoff]                                                           | AGES Ind. Nr | Kulturen lt. AGES                                                                   | Schaderreger                                                                                                                                                                                                        | Aufwandmenge                                  | Max Anwendungen | Zeitabstand (Tage)        | Wartezeit (Tage) | Zulassungsende /<br>Aufbrauchsfrist |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                       | 4            | Zierpflanzenkulturen, Gemüsekulturen, Erdbeeren, Beerenobst (Ausgenommen Erdbeeren) | Trauermücken [Sciaridae]                                                                                                                                                                                            | 5 Nematoden/ha<br>Max. 5 Mrd.<br>Nematoden/ha | 3               | 7 Mind.                   | ---              | 30.06.2039 / ---                    |
|                                                                                                       |              |                                                                                     | Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                                                                                                                                                     |                                               |                 |                           |                  |                                     |
|                                                                                                       | 6            | Zierpflanzenkulturen, Gemüsekulturen                                                | Wurzelspinner [Korscheltellus lupulina]                                                                                                                                                                             | 5 Nematoden/ha<br>Max. 5 Mrd.<br>Nematoden/ha | 3               | 7 Mind.                   | ---              | 30.06.2039 / ---                    |
|                                                                                                       |              |                                                                                     | Anwendungszeitpunkt: Bei Befall                                                                                                                                                                                     |                                               |                 |                           |                  |                                     |
| Molluskizid                                                                                           |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                 |                           |                  |                                     |
| Ferrex (4051/0) [Bio]<br>[Eisen(III)-Phosphat]                                                        | 2            | Gemüsekulturen                                                                      | Nacktschnecken [-]                                                                                                                                                                                                  | 6 kg/ha                                       | 5               | Mind. 7                   | ---              | 31.12.2031 / ---                    |
|                                                                                                       |              |                                                                                     | Anwendungszeitpunkt: Bei Befall bzw. ab Erreichen von Schadschwellen                                                                                                                                                |                                               |                 |                           |                  |                                     |
| Nemaslug (3969/0) [Bio]<br>[Entomopathogene Nematoden<br>(Phasmarhabditis hermaphrodita<br>[PHSMHE])] | 1            | Gemüsekulturen                                                                      | Ackerschnecken [Deroceras sp.], Wegschnecken [Arion sp.]                                                                                                                                                            | 300000<br>Nematoden/m²                        | 3               | miind. 2<br>- 6<br>Wochen | ---              | 30.09.2033 / ---                    |
|                                                                                                       |              |                                                                                     | Anwendungszeitpunkt: März bis Oktober                                                                                                                                                                               |                                               |                 |                           |                  |                                     |
| SluXX HP (3317/0) [Bio]<br>[Eisen(III)-Phosphat]                                                      | 2            | Gemüsekulturen, Kräuter, Gewürze und Heilkräuter/Arzneipflanzen                     | Nacktschnecken [-]                                                                                                                                                                                                  | 7 kg/ha                                       | 4               | ---                       | ---              | 31.12.2031 / ---                    |
|                                                                                                       |              |                                                                                     | Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome., Wiederholung bei erneutem Auftreten von Schnecken und/oder wenn keine Granulate mehr auf der behandelten Fläche vorhanden sind |                                               |                 |                           |                  |                                     |
|                                                                                                       | 9            | Gemüsekulturen, Kräuter, Gewürze und Heilkräuter/Arzneipflanzen                     | Nacktschnecken [-]                                                                                                                                                                                                  | 7 kg/ha                                       | 4               | ---                       | ---              | 31.12.2031 / ---                    |
|                                                                                                       |              |                                                                                     | Anwendungszeitpunkt: Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome., Wiederholung bei erneutem Auftreten von Schnecken und/oder wenn keine Granulate mehr auf der behandelten Fläche vorhanden sind |                                               |                 |                           |                  |                                     |

## Pflanzenschutzmittel Liste der Kultur Chinakohl (Freiland)

Zur besseren Übersichtlichkeit sind in der Pflanzenschutzmittelliste nur Hauptzulassungen angeführt, erkennbar an /0 zur Registernummer, keine „Parallelgenehmigungen“ und auch keine „Vertriebserweiterung“.

Ein Pflanzenschutzmittel mit „Vertriebserweiterung“ hat die gleiche Zulassungsregisternummer, jedoch mit einer zusätzlichen Vertriebsnummer (dreistellige Zahl), ein „parallel genehmigtes“ Pflanzenschutzmittel hat eine zusätzliche Ziffer. Ein parallel genehmigtes Pflanzenschutzmittel kann jedoch auch eine andere Handelsbezeichnung als das ursprünglich in Österreich zugelassene Pflanzenschutzmittel haben (in der Regel auch zum Zulassungsinhaber, unterschiedliche Genehmigungsinhaber).

Die gegenständlichen Erläuterungen stellen einen Auszug aus dem Verzeichnis der in Österreich zugelassenen/genehmigten Pflanzenschutzmittel der AGES dar. Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher Angaben sind Fehler nicht ausgeschlossen. Die Richtigkeit des Inhaltes ist daher ohne Gewähr. Im Falle von Unklarheiten nehmen Sie bitte mit Ihrem zuständigen Berater der Landwirtschaftskammer Kontakt auf. Nutzung nur für Landwirte. Gewerbliche Nutzung ist untersagt.